


Ablauf der Versorgung der Vertrags- und Privatärzte mit COVID-19-Impfstoffen



Entnahme des BioNTech-Impfstoffs aus der Ultratiefkühlung
Montag früh

Großhandel
Vorbereitung der Lieferung an die Apotheken

- Vorbereitung der Lieferung an die Apotheken**
- Entnahme des Impfstoffs Comirnaty® (BioNTech) aus der Ultratiefkühlung und Überführung in Sekundärverpackung
 - Beginn des Auftauprozesses
 - Dokumentation des Auftauprozesses
 - Entnahme des Impfstoffs COVID-19 Vaccine Janssen aus dem Kühlschrank in Originalverpackung oder ggf. Überführung in Sekundärverpackung
 - Dokumentation des Verfallsdatums
 - Entnahme des Impfstoffes Vaxzevria® (AstraZeneca) aus dem Kühlschrank in Originalverpackung oder ggf. Überführung in Sekundärverpackung
 - Überführung der Impfstoffe in Kühlboxen (2°C bis 8°C)
 - Zugabe des Impfzubehörs pro Einzelbestellung

Großhandel
Lieferung der Impfstoffe an die Apotheke

- Lieferung an die Apotheken**
- in qualifizierten passiven Kühltransportboxen bei 2°C bis 8°C ohne Temperaturlogger
 - Begleitdokumentation des Auftauprozesses für Comirnaty® und Verfallsdatum COVID-19 Vaccine Janssen
 - Impfzubehör

Montag

Apotheke
Eintreffen der Impfstofflieferung in der Apotheke

- Überprüfung des Wareneingangs (Impfstoffe und benötigtes Zubehör)
- ggf. Zwischenlagerung des Impfstoffs bei 2°C bis 8°C im Kühlschrank

SOP Umgang mit Vaxzevria® in der Apotheke

SOP Umgang mit COVID-19 Vaccine Janssen in der Apotheke

SOP Umgang mit Comirnaty® in der Apotheke

Apotheke
Zusammenstellen der Lieferungen für die einzelnen Vertrags-/Privatarztpraxen

- Zusammenstellen der Lieferungen für die Vertrags- und Privatarztpraxen**
- Impfstoff-Vials pro Praxis in geeigneter Sekundärverpackung
 - Transport in Kühlboxen bei 2°C bis 8°C
 - Begleitdokumentation über Auftauprozess/Verfallsdatum und Transportdauer
 - Impfzubehör pro Arztpraxis

Formblatt Begleitdokumentation COVID-19-Impfstoffe

Übersicht über Impfzubehör

Montag, spätestens Dienstag früh

Apotheke
Auslieferung an die Vertrags-/Privatarztpraxen

- Lieferung an die Vertrags-/Privatarztpraxen**
- in Kühlboxen bei 2°C bis 8°C
 - persönliche Übergabe an Mitarbeiter/in der Praxis
 - mündlicher Hinweis auf Begleitdokumentation, insbesondere zur Kühlkettenpflicht
 - Dokumentation der Transportdauer
 - Bestätigung des Empfangs
 - Begleitdokumentation verbleibt in Arztpraxis; Kopie zurück in die Apotheke

Vertrags- und Privatarztpraxis
Lagerung der Impfstoffe bei 2°C bis 8 °C im Kühlschrank

Vertrags- und Privatarztpraxis
Verimpfung der Impfstoffe

- Verimpfung des Impfstoffs**
- **Comirnaty® von BioNTech** bis zu 31 Tagen (1 Monat) nach Beginn des Auftauprozesses (siehe Begleitdokumentation)
 - **Vaxzevria® von AstraZeneca** gemäß Herstellerangaben auf der Durchstechflasche an Patienten entspr. STIKO-Empfehlung
 - **COVID-19 Vaccine Janssen** bis 3 Monate nach Beginn des Auftauprozesses (siehe Begleitdokumentation)